

Direction Nationale du Cameroun
B.P. 1256 Bafoussam, Cameroun ; Tél +237 694 02 14 74
E-mail : cipcre_cameroun@cipcre.org ; Site web : <http://www.cipcre.org>

LUTTE CONTRE LES DIFFERENTES DIARRHEES CHEZ LES PORCELETS

Type de produit : **Complément alimentaire**

Catégorie : **anti diarrhéique**

Forme : **poudre et liquide**

Type d'élevage : **Porcine**

Usage : **Préventif et curatif**

Durée du traitement : **03 à 05 jours**



Généralités :

Après la mise bas, les porcelets sont souvent sujets à la diarrhée qui peut être causée par :

- L'environnement (stress, hygiène)
- L'alimentation (lait maternel, provende, eau)

Elle survient généralement après la naissance (dès que le porcelet consomme le lait maternel diarrhée du lait), et dès que le porcelet commence à s'alimenter d'aliments autre que le lait (diarrhée due à l'aliment) et après le sevrage.

Symptômes :

- Selles molles, liquides de couleur blanchâtre
- Perte d'appétit
- Amaigrissement
- Chute de la croissance



Traitements :

Traitements préventifs :

Biosécurité : Instaurer une bonne hygiène dans la ferme, protéger la ferme contre les mouches, respect de la fiche de la prophylaxie, bonne alimentation.

Traitements curatifs :

- Supplémenter l'alimentation de la truie en fer avec les feuilles de patate et les feuilles de manioc
- Macérer les feuilles de goyavier et administrer le jus aux porcelets. Utiliser 10 jeunes feuilles pour 01 verre d'eau. Donner 05 à 10 ml par porcelet
- Donner la terre rouge en alimentation à la truie à la dose de 01 poignée dans l'alim

Autres diarrhée :

- Mélanger 01 poignée de terre rouge dans l'aliment des porcelets
- Utiliser la poudre de charbon des arbres fruitiers notamment les plus jeunes feuilles de goyavier dans l'aliment, soit 01 poignée de poudre de charbon dans 0.5 kg d'aliment, 01 poignée de jeunes feuilles dans l'aliment
- 01 kg de farine de maïs dans 05 L d'eau de boisson
- Appliquer le traitement pendant 03 à 05 jours